

Nom du patient :

.....

Nom du médecin :

.....

Numéro de téléphone du médecin :

.....

Date d'instauration du traitement  
par Remsima :

.....

Administrations actuelles :

.....

Assurez-vous d'avoir aussi avec vous une  
liste de tous les autres médicaments que  
vous utilisez lors de chaque visite auprès  
d'un professionnel de santé.

Liste des autres médicaments :

.....

.....

.....

Liste des allergies :

.....

.....

.....

Demandez à votre médecin de consigner  
le type et la date du (des) dernier(s) test(s)  
de dépistage de la tuberculose (TB)  
ci-dessous :

Test : .....

Date : .....

Résultat : .....

P05776-08/17 – Août 2017



LM106807—PA003

**Carte de  
Signalement  
Patient**

**Remsima<sup>®</sup>**  
Infliximab

**Montrez cette carte  
à tous les médecins  
impliqués dans votre  
traitement.**

**Cette Carte de Signalement contient des informations importantes de sécurité que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par Remsima.**

Gardez cette carte sur vous pendant 4 mois après votre dose de Remsima, ou en cas de grossesse pendant au moins 6 mois après la naissance de votre bébé. Les effets indésirables peuvent survenir longtemps après votre dernière dose.

Il est important que vous et votre médecin consigniez le nom et le numéro de lot de votre médicament.

Veillez lire la « Notice » de Remsima attentivement avant de commencer à utiliser ce médicament.

## | Infections |

### Avant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin si vous présentez une infection, même si elle est très légère.
- Il est très important d'informer votre médecin si vous avez déjà présenté une tuberculose (TB) ou si vous avez été en contact avec une personne ayant déjà présenté une tuberculose. Votre médecin vous fera subir des tests pour voir si vous avez la tuberculose. Demandez à votre médecin de consigner le type et la date de votre (vos) dernier(s) test(s) de dépistage de la tuberculose sur la carte.
- Veuillez informer votre médecin si vous souffrez de l'hépatite B ou si vous savez ou suspectez que vous êtes porteur du virus de l'hépatite B.

### Durant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin immédiatement si vous présentez les signes d'une infection. Les signes incluent de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux (persistante), un essoufflement, une perte de poids, des sueurs nocturnes, de la diarrhée, des plaies, des problèmes dentaires, des brûlures à la miction ou des signes « pseudo-grippaux ».

## | Insuffisance cardiaque |

### Avant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin si vous présentez des problèmes cardiaques quelconques tels qu'une légère insuffisance cardiaque.

### Durant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin immédiatement si vous remarquez des signes d'un problème cardiaque. Les signes incluent un essoufflement, un gonflement des pieds ou des modifications du rythme cardiaque.

## | Grossesse et vaccinations |

- Si vous avez reçu Remsima pendant votre grossesse, il est important d'en informer votre pédiatre avant que votre bébé ne reçoive un vaccin. Votre bébé ne doit pas recevoir de « vaccin vivant », comme le BCG (utilisé pour prévenir de la tuberculose) dans les 6 mois après la naissance.